

# Avertissements agricoles



PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Bulletin n° 13  
Le 24 Mai 1984

## VIGNE

### MILDIU : PREMIER TRAITEMENT DES QUE POSSIBLE.

Les pluies observées la semaine passée ont été très favorables à la germination des oeufs d'hiver. Il est à craindre que de nombreux foyers primaires soient observés en début de semaine prochaine (28 Mai), le mildiou ayant été très présent dans le vignoble en automne 1983.

Un premier traitement anti-mildiou est donc conseillé en toute zone dès la fin de cette semaine.

Pour le choix des spécialités, nous vous demandons de vous reporter à la note mildiou du bulletin n° 6 du 29.03.84. Nous vous rappelons :

- Anilides - (ACYLON, CALTAN, VAMIN); ne pas utiliser avant le stade G/H (grappes séparées à boutons floraux séparés). Les utiliser de préférence à la floraison en ne dépassant pas 2 à 3 applications.
- Phosethyl Al - (MIKAL, RHODAX): en période de croissance rapide et de risques élevés, adoptez une cadence de 10-12 jours.

### OIDIUM : MAINTENEZ LA PROTECTION.

Si le risque mildiou coïncide avec un traitement oïdium, vous pouvez utiliser les spécialités suivantes, efficaces à la fois sur les deux maladies.

Alliance : (3 kg P.G./ha) phosethyl Al + folpel + fénarimol.

Diaméтан B : (2,5 kg P.C./ha) cymoxamil + propinèbe + triadiméfon.

### TORDEUSES : ATTENDRE PROCHAIN BULLETIN.

### PYRALE : RAPPEL ZONES TARDIVES.

En zones tardives (St-Maximin, Brignoles), les chenilles seront au stade 3 à 5 mm en fin de semaine prochaine.

## ARBORICULTURE

### TOUTES ESPECES

#### CHUTE DE GRELE.

Sur les arbres sensibles au cuivre (pommiers, poiriers, pêchers notamment), traiter avec un des produits conseillés contre les tavelures dans les 20 heures qui suivent la chute.

Sur pruniers, on pourra intervenir avec une bouillie bordelaise à 1 % ou autre produit cuprique à raison de 250 g de cuivre métal/hl.

ACARIENS : Attention à l'éclosion des premiers oeufs d'été, surveiller la population.

Quartier Cantarel - B.P. 95 84140 MONTFAVET - Téléphone : (90) 88.21.83

ABONNEMENT ANNUEL : EDITION GENERALE 100 F - TOMATE 45 F - VITI. VAR 45 F - CERISIER 45 F

## **ARBRES FRUITIERS A PEPINS**

### **TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER: ATTENTION AUX CONTAMINATIONS SECONDAIRES.**

Maintenir la protection en toutes régions. Surveiller l'apparition des premières tâches pouvant apparaître surtout à partir de la fin du mois.

### **CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES: DEBUTER LA PROTECTION LARVICIDE.**

Dès maintenant dans les régions les plus précoces et commencer début Juin vers 300-400 m d'altitude, suite à la dernière période froide et pluvieuse traversée.

Aucune éclosion n'a été observée à Rourebeau (H.A.) 600 m d'altitude.

### **OIDIUM : POURSUIVRE LA PROTECTION.**

En particulier dans les vergers de pommiers sensibles ayant eu des attaques primaires (bouquets foliaires plus ou moins desséchés).

### **PSYLLE DU POIRIER : CONTROLER LA PRESENCE DES LARVES.**

Vous interviendrez dès que 10 % des pousses sont atteintes. Utiliser de préférence l'amitraz (Maïtac, Tudy) 60 g M.A./hl préservant davantage la faune auxiliaire et actif sur les acariens.

### **MINEUSE CERCLEE (L.scitella) SUR POMMIER : ATTENDRE UN PROCHAIN BULLETIN.**

En ce qui concerne l'exportation des pommes vers le Canada, les Etats-Unis et le Moyen-Orient, prière de prendre contact avec notre Service pour en connaître toutes les conditions.

### **PUCERONS : SURVEILLER LEUR PRESENCE.**

Intervenir avant que les feuilles ne s'enroulent.

## **ARBRES FRUITIERS A NOYAU**

### **OIDIUM : MAINTENIR LA PROTECTION.**

Sur toutes les variétés sensibles d'abricotiers, pêchers et nectarines.

### **TORDEUSE ORIENTALE DU PECHEUR: RENOUELER LA PROTECTION.**

Sur les jeunes arbres en formation ou en pépinière.

### **FORFICULES:**

Dès les premiers dégâts, intervenir sur pêchers, de préférence le soir avec naled (Ortho-Dibrom): 100 g M.A./hl, jusqu'à 8 jours de la récolte.

### **CYLINDROSPORIOSE DU CERISIER ET MONILIA :**

Sur les variétés sensibles et dès l'apparition des premières tâches, on interviendra avec un produit valable contre le monilia.

### **CARPOCAPSE DU PRUNIER: DEBUT DE LA PROTECTION.**

Dans les secteurs précoces et les variétés tardives, un traitement est à prévoir dès maintenant avec phosalone ou azinphos (larvicides).

### **ROUILLE DU PRUNIER :**

Sur variétés sensibles, utiliser notamment un produit à base de manèbe, mancozèbe ou zirame.

## **CULTURES LEGUMIERES**

### **MILDIOU DE LA POMME DE TERRE :**

Assurer dès à présent la protection en toutes zones.

### **TEIGNE DU POIREAU :**

Le vol se termine.

## **CEREALES**

### **PUCERONS :**

Les pucerons sont maintenant sur épi et le seuil d'intervention souvent atteint. Reportez-vous à notre bulletin n° 11 du 10.05.84.

### **ROUILLE BRUNE :**

Pas d'attaque déclarée, mais maintenir une surveillance attentive compte tenu des pluies et de la rapidité possible d'évolution. Voir notre bulletin n° 11 du 10.05.84.